

ಕಾರ್ಬಡರ್ಲೈಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ



ನಿದೇರ್ಶನದ ಅನುಸಾರ
ಒತ್ತುಪ್ಪು ಬಳಸಿ



ಸಾಮಾನ್ಯ
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ



ಮಲಗುವಾಗ
ಬೀಳೀಗ್ರಾಫಿ



ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಕೆನ್ಸಿಡೆಗಳನ್ನು
ಧರಿಸಿ



ಒದುವ್ವು, ಬರೆಯುವುದು,
ಟೆಪಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು
ನಡೆದಾಡುವುದು, ಮುಂತಾದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಪಾರಂಭಿಸಿ



ಕಣ್ಣನ ನೋವು, ಕೆಂಪುತನ,
ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗುವಿಕೆ
ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕಣ್ಣನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆನ್ಸು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.



ಕಣ್ಣ ಶಿಕ್ಕುವುದು



ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 2-3 ವಾರಗಳ
ನಂತರದವರೆಗೆ ತೆಲಿಯ ಮೇಲೆ
ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು



ಯಾವ ಕಣ್ಣನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ
ಆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು



ಕಣ್ಣನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆ
ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿ
ಸಿಗುವೆರೆಗೆ
ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿ



ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುವಂಥ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದು



ಧೂಳು/ಮಣ್ಣು/ಉಷ್ಟೆ
ಮತ್ತು ರಾಷಾಯನಿಕಗಳ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಾರ್ಥಿಕ

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥಕ